

PESQUISA: Avaliação longitudinal da necessidade de antibioticoterapia profilática na extração de terceiros molares em pacientes saudáveis.

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Roberto E. Campos,

Critérios inclusão: idade mínima 18 anos e pelo menos um terceiro molar inferior

Critérios exclusão: mulheres grávidas, doença sistêmica, infecção na área de extração, uso corrente de outro(s) antibiótico(s), imunossupressão, sangramento intestinal ou ulceração, doença cardiovascular ou renal, e alergia ao anestésico local.

PARTICIPANTE Nº _____ PRONTUÁRIO HO _____

Condição oral pré-operatória:

- () BOA- baixo índice de placa, sem/com discreta gengivite
() RUIM- alto índice de placa/tártaro e/ou doença periodontal evidente
() FUMANTE- () SIM () NÃO

1- () Grupo Controle () Grupo Profilático Antes () Grupo Profilático Pós

2- Dente(s) extraído(s) e classificação de Pell & Gregory:

18 () - 28 () - 38 () - 48 ()

3- Duração aproximada de cada extração (da diérese até a síntese):

18 _____ - 28 _____ - 38 _____ - 48 _____

4- Grau de dificuldade (para cada dente):

4.1- Fácil (com ou sem retalho mucoperiosteal) ()

4.2- Moderado (retalho + odontosecção – sem ostectomia) ()

4.3- Difícil (retalho + odontosecção + ostectomia) ()

AValiação Pós-Operatória – 3 dias

5- Higienização oral: () Satisfatória () Insatisfatória

6- Fez uso correto do Ibuprofeno? () SIM () NÃO

7- Fez uso correto da Dipirona? () SIM () NÃO

8- Sentiu dor mesmo com uso da medicação? () SIM () NÃO

7.1- Em que momento(s): _____

7.2- Qual nível de 1 a 10? _____

9- Edema: () NÃO () Moderado () Médio () Severo

9.1- Se edema presente, aspecto de origem pós-operatória? SIM () - NÃO ()

10.1-Tipo e severidade:

[illegible]